


TABELLEN
zu klinisch-bakteriologischen
Untersuchungen für
Chirurgen und Gynäkologen
von
Dr. W. LIEPMANN





22102096664

Med
K17671



TABELLEN

zu

klinisch-bakteriologischen Untersuchungen

für

Chirurgen und Gynäkologen

nebst einer kurzen Anleitung zur Ausführung der „Dreitupferprobe“

von

Dr. W. Liepmann,

Privatdozent an der Friedrich Wilhelms-Universität zu Berlin,
Oberarzt an der Universitäts-Frauenklinik der Königl. Charité.

Berlin 1909.

Verlag von August Hirschwald.

NW. Unter den Linden 68.

10 001 027

WELLCOME INSTITUTE LIBRARY	
Call	WIMDmec
Call	
No.	01



Vorwort.

Der Anlass zur Herausgabe dieser Tabellen war die mündliche und schriftliche Aufforderung einer Reihe von Kollegen, ihnen die Formulare, die in der Universitäts-Frauenklinik der Königl. Charité zur Anstellung der „Dreitupferprobe“ gebraucht werden, zugänglich zu machen. Die Eigenart dieser klinisch-bakteriologischen Untersuchungen bei Operationen machte dann noch einige kurze, orientierende Bemerkungen notwendig.

Berlin, im Dezember 1908.

W. Liepmann.



Anleitung zur Ausführung der „Dreitupferprobe“.

Unter »Dreitupferprobe« verstehen wir die bakteriologische, dreimalige Untersuchung des Operationsgebietes, und zwar vor, während und nach der Operation.

Der Zweck dieser bakteriologischen Untersuchung ist der, dem Operateur mehr wie früher die Möglichkeit zu geben, sich und sein Personal zu kontrollieren, das klinische Krankheitsbild zu klären und ihn so in den Stand zu setzen, eine bessere Prognose zu stellen und sich leichter zu eventuell nötigen postoperativen Eingriffen zu entschliessen.

Die Technik: Den Zwecken der Operation angepasst ist die technische Ausführung der Dreitupferprobe äusserst einfach, nicht zeitraubend und auch in der kleinsten Klinik ausführbar.

Die Keimentnahme erfolgt in der Regel, besonders aber während der Operation, durch Verimpfen der bei der Operation verwandten, in der üblichen Weise sterilisierten Tupfer. Um sich über die absolute Keimfreiheit des Tupfermaterials ein Urteil zu verschaffen, ist es zweckmässig, von Zeit zu Zeit Kontrollproben mit sterilisierten, aber nicht gebrauchten Tupfern anstellen zu lassen. Die Tupfer werden bei der Operation am besten als sogenannte Stiltupfer, die mit Kugelzangen armiert sind, verwandt. Sobald der Operateur einen Tupfer im Operationsgebiet, dessen Keimgehalt er kennen will, gebraucht hat, wirft er ihn in ein bereit gehaltenes, trocken sterilisiertes Petrischälchen. (Wir benutzten zur Sterilisation von Glassachen einen Trockensterilisator von Lautenschläger.) Auf das Schälchen wird mit dem Fettstift ein kurzer Vermerk über Zeit und Ort der Keimentnahme gemacht. (Die Art der Technik ist einfacher als die früher von uns geübte, bei der wir die Tupferproben sofort in die bereitgehaltenen Bouillonröhrchen übertrugen.)

Nach Ausführung der Operation werden nun die verschiedenen Petrischälchen protokolliert und von jedem Tupfer ein möglichst grosses Stückchen mit steriler, am besten abgeglühter Schere in ein mit gleichlautendem Vermerk versehenes Bouillonröhrchen, dessen Rand vorher sorgfältig abzuglühen ist, übertragen. Sämtliche Reagensgläser werden dann in den Brutschrank (Temp. 37, 5—8) gestellt. Am nächsten Tage werden die Bouillonröhrchen untersucht. Nach dem Umschütteln sieht man meist ohne weiteres, welche Röhrchen keimbesiedelt, getrübt und welche keimfrei, klar sind. Mit einer Platinöse wird jetzt ein möglichst dicker Tropfen auf einen gereinigten Objektträger aufgetragen, ohne ihn zu verreiben. Je dicker der Tropfen dem Glase aufliegt, um so leichter ist die nachherige Untersuchung. Lufttrocken werden lassen. Dreimaliges Fixieren in der Flamme. Färben mit Methylenblau oder Karbol-fuchsin. Abspülen mit Wasser. Abtrocknen mit Fliesspapier. Cedernöl und Besichtigung des Präparates mit der Oelimmersion.

Ausser der Verimpfung der Tupfer kommt häufig **vor** der Operation und post mortem die Entnahme von Abszesseiter oder Peritonealflüssigkeit durch die Pravazspritze in Frage. Hier wird am besten vor der Verimpfung auf den Nährboden ein mikroskopisches Präparat gemacht, in gleicher Weise wie oben beschrieben. Ausserdem aber eine Impfung auf Bouillon vorgenommen, da man häufig im mikroskopischen Bilde keine Keime findet, während sie sich im Nährboden reichlich entwickeln.

Als dritte Art der Verimpfung kommt die Stückchen-Uebertragung der Gewebe in Betracht. Während der Operation wird das betreffende Gewebstück ebenso wie die Tupfer in eines der bereitstehenden Petrischälchen geworfen und nachher in gleicher Weise verimpft. Bei Entnahme von Gewebspartien vom exstirpierten Präparat werden die betreffenden Stücke gleich direkt in die Bouillon übertragen. Kommt es in bestimmten Fällen darauf an, sich ein Urteil über die tiefer im Gewebe liegenden Keime zu bilden, etwa über die Keime im Inneren der Parametrien, dann muss man mit einem glühend gemachten Messer oder Paquelin die Oberfläche der Gewebe verschorfen und dann erst unter exakt sterilen Kautelen Gewebspartikelchen aus der Tiefe entnehmen.

Die Verwertung der bakteriologischen Befunde für die Prognose und im klinischen Verlauf erfordert wie jedes diagnostische Hilfsmittel eine gewisse Vertrautheit mit der Methode. Es würde den Rahmen dieser einleitenden

Bemerkungen bei weitem überschreiten, wollte man alle klinischen Möglichkeiten hier besprechen. Diesbezüglich sei auf meine Arbeit »Bakteriologie und Prognose«, Berl. klin. Wochenschrift, 1908, No. 22, verwiesen.

Die genaue Kenntnis der Keime vor der Operation gibt dem Operateur wichtige Fingerzeige für die Anlage der Operation (z. B. streptokokkenhaltige Adnextumoren erfordern Drainage, gonokokkenhaltige machen diese unnötig).

Ist während der Operation eine Keimbesiedelung mit Streptokokken eingetreten, zeigt die Puls- und Temperaturkurve des Patienten ein damit übereinstimmendes Bild, so kann die rechtzeitig vorgenommene Drainage des Operationsgebietes zur Heilung führen.

Und schliesslich wird oft die bakteriologische Untersuchung post mortem ein mehr der Wahrheit entsprechendes Bild zeigen, als die einfache pathologisch-anatomische Sektion.


Lfd. No.	Name. (Anamnese.)	Untersuchung vor der Operation. A. P. = Punktion vom Abdomen. V. P. = " von d. Vagina. St. = Stückchen-Impfung.	Art der Operation. (Kurzer Bericht.)	Untersuchung während d. Operation. T. = Tupfer. D. = Drüsen.
2. VII. 1906.	R., 46 Jahre alt. Carcinoma cervicis.	Carcinom vor und nach Behandlung mit 10% Formalin (Mackenrodt) steril.	Totale Beckenausäumung nach Wertheim-Bumm. Einbruch in das Carcinom, keine Drainage. Chloroformäthernarkose. Erstlingsoperation eines Assistenten. Operationsdauer: 2 Std. 25 Min.	T ₁ nach Eröffnung der Bauchhöhle. T ₂ Freilegen des rechten Ureters. T ₃ Freilegen des linken Ureters. T ₄ nach Exstirpation des Uterus und der Parametrien. T ₅ vor Schluss der Bauchhöhle. Alle steril.
5. V. 1906.	B., 37 Jahre alt. Carcinoma portionis.	Im Carcinom Streptokokken bis zu 20 Gliedern.	Totale Beckenausäumung nach Wertheim-Bumm. Eine taubeneigrosse Drüse platzt bei der Ausschälung. Keine Drainage. Chloroformäthernarkose. Dauer: 1 Std. 23 Min.	T ₁ nach Eröffnung der Bauchhöhle. T ₂ Freilegen des rechten Ureters. T ₃ Freilegen des linken Ureters. T ₄ nach dem Bersten der Drüse. T ₅ vor Schlusss der Bauchhöhle. T ₁ —T ₃ steril. T ₄ und T ₅ Streptokokken in Reinkultur.

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)

Stückchenimpfung aus
den Drüsen und den
Parametrien.


Steril.



Reaktionsloser Verlauf.

W = Abgang von Flatus.

Drüse.
Streptokokken in
Reinkultur.





W = Abgang von Flatus.

Exitus am 4. Tage (Streptokokkenperitonitis).

Lfd. No.	Name. (Anamnese.)	Untersuchung vor der Operation. A. P. — Punktion vom Abdomen. V. P. — " von d. Vagina. St. — Stillechen-Impfung.	Art der Operation. (Kurzer Bericht.)	Untersuchung während d. Operation. T. = Tupfer. D. = Drüsen.

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.



Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



[illegible]

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



[illegible]



Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)

[illegible][illegible]

[illegible]

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. Parametrium.



Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



[illegible]

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)

P. = Parametrium.





Lfd. No.	Name. (Anamnese.)	Untersuchung vor der Operation. A. P. = Punktion vom Abdomen. V. P. = " von d. Vagina. St. = Stückchen-Impfung.	Art der Operation. (Kurzer Bericht.)	Untersuchung während d. Operation. T. = Tupfer. D. = Drüsen.

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)

[illegible][illegible]



Lfd. No.	Name. (Anamnese.)	Untersuchung vor der Operation. <small>A. P. = Punktion vom Abdomen. V. P. = " von d. Vagina. St. = Stückchen-Impfung.</small>	Art der Operation. (Kurzer Bericht.)	Untersuchung während d. Operation. <small>T. = Tupfer. D. = Drüsen.</small>

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



[illegible]



Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



Lfd. No.	Name. (Anamnese.)	Untersuchung vor der Operation. <small>A. P. = Punktion vom Abdomen. V. P. = " von d. Vagina. St. = Stückchen-Impfung.</small>	Art der Operation. (Kurzer Bericht.)	Untersuchung während d. Operation. <small>T. = Tupfer. D. = Drüsen.</small>



Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)





Lfd. No.	Name. (Anamnese.)	Untersuchung vor der Operation. A. P. = Punction vom Abdomen. V. P. = " von d. Vagina. St. = Stückchen-Impfung.	Art der Operation. (Kurzer Bericht.)	Untersuchung während d. Operation. T. = Tupfer. D. = Drüsen.

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



[illegible]



Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



[illegible]

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)

P. Parametrium.



Lfd. No.	N a m e. <small>(Anamnese.)</small>	Untersuchung vor der Operation. <small>A. P. = Punktion vom Abdomen. V. P. = von d. Vagina. St. = Stückchen-Inpfung.</small>	Art der Operation. <small>(Kurzer Bericht.)</small>	Untersuchung während d. Operation. <small>T. = Tupfer. D. = Drüsen.</small>



nach der Operation

vom Präparat.

P. = Parametrium.

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.



(Sektionsbericht.)



[illegible]

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.



Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



Lfd. No.	Name. (Anamnese.)	Untersuchung vor der Operation. A. P. = Punktion vom Abdomen. V. P. = " von d. Vagina. St. = Stückchen-Impfung	Art der Operation. (Kurzer Bericht.)	Untersuchung während d. Operation. T. = Tupfer. D. = Drüsen.

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



[illegible]



Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)

[illegible][illegible]

[illegible]

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



[illegible]



nach der Operation

vom Präparat.

P. = Parametrium.

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.



(Sektionsbericht.)



[illegible]

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.



Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



[illegible]

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.



Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



[illegible]

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.



Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



Lfd. No.	Name. (Anamnese.)	Untersuchung vor der Operation. A. P. = Punktion vom Abdomen. V. P. = " von d. Vagina. St. = Stückchen-Impfung	Art der Operation. (Kurzer Bericht.)	Untersuchung während d. Operation. T. = Tupfer. D. = Drüsen.

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. — Parametrium.



Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



Lfd. No.	Name. (Anamnese.)	Untersuchung vor der Operation. A. P. = Punktion vom Abdomen. V. P. = " von d. Vagina. St. = Stückchen-Impfung.	Art der Operation. (Kurzer Bericht.)	Untersuchung während d. Operation. T. = Tupfer. D. = Drüsen.

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.



Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



[illegible]

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.



Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



[illegible]

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



[illegible]



Untersuchung nach der Operation

vom Präparat.

P. = Parametrium.

Kurze. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.



(Sektionsbericht.)



[illegible]

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.



Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



[illegible]



Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. — Parametrium.

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



[illegible]



Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



[illegible]

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



P, = Parametrium.



[illegible]

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.



Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



[illegible]



Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



[illegible]

Untersuchung nach der Operation

vom Präparat.

P. = Parametrium.

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.



(Sektionsbericht.)

[illegible][illegible]

Lfd. No.	N a m e. (Anamnese.)	Untersuchung vor der Operation. A. P. = Punktion vom Abdomen. V. P. = " von d. Vagina. St. = Stückchen-Impfung.	Art der Operation. (Kurzer Bericht.)	Untersuchung während d. Operation T. = Tupfer. D. = Drüsen.

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.



Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



[illegible]

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.



Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



Lfd. No.	N a m e. (Anamnese.)	Untersuchung vor der Operation. A. P. = Punktion vom Abdomen. V. P. = " von d. Vagina. St. = Stückchen-Impfung.	Art der Operation. (Kurzer Bericht.)	Untersuchung während d. Operation. T. = Tupfer. D. = Drüsen.

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.



Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



[illegible]

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.



Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



Lfd. No.	Name. (Anamnese.)	Untersuchung vor der Operation. A. P. = Punktion vom Abdomen. V. P. = " von d. Vagina. St. = Stückchen-Impfung.	Art der Operation. (Kurzer Bericht.)	Untersuchung während d. Operation. T. = Tapfer. D. = Drüsen.

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



P. = Parametrium.



Lfd. No.	Name. (Anamnese.)	Untersuchung vor der Operation. A. P. = Punktion vom Abdomen. V. P. = " von d. Vagina. St. = Stillekchen-Impfung.	Art der Operation. (Kurzer Bericht.)	Untersuchung während d. Operation. T. = Tupfer. D. = Drüsen.

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.



Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



[illegible]

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)





[illegible]

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.

P. = Parametrium.

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.

(Sektionsbericht.)



Lfd.
No.

N a m e.
(Anamnese.)

Untersuchung
vor der Operation.



A. P. = Punktion vom Abdomen.
V. P. = " von d. Vagina.
St. = Stückchen-Impfung.

Art
der Operation.
(Kurzer Bericht.)

Untersuchung
während d. Operation.
T. = Tupfer. D. = Drüsen.

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)

P. = Parametrium.





[illegible]

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)

(Sektionsbericht.)



P, = Parametrium.



[illegible]

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.



Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



[illegible]

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



P. = Parametrium.



[illegible]

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



Lfd. No.	Name. (Anamnese.)	Untersuchung vor der Operation. A. P. = Punktion vom Abdomen. V. P. = " von d. Vagina. St. = Stückchen-Impfung.	Art der Operation. (Kurzer Bericht.)	Untersuchung während d. Operation. T. = Tupfer. D. = Drüsen.



Untersuchung nach der Operation

vom Präparat.

P. = Parametrium.

Kurze. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.



(Sektionsbericht.)



[illegible]

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)



Lfd.
No.

Name.
(Anamnese.)

Untersuchung
vor der Operation.

A. P. = Punktion vom Abdomen.
V. P. = " von d. Vagina.
St. = Stückchen-Impfung.

Art
der Operation.
(Kurzer Bericht.)

Untersuchung
während d. Operation.

T. = Tupfer. D. = Drüsen.

Untersuchung
nach der Operation
vom Präparat.
P. = Parametrium.

Kurve. Krankheitsbericht. Besondere Bemerkungen.
(Sektionsbericht.)

P. T.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
210 42,5																												
200 42,0																												
190 41,5																												
180 41,0																												
170 40,5																												
160 40,0																												
150 39,5																												
140 39,0																												
130 38,5																												
120 38,0																												
110 37,5																												
100 37,0																												
90 36,5																												
80 36,0																												
70 35,5																												
60 35,0																												

P. T.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
210 42,5																												
200 42,0																												
190 41,5																												
180 41,0																												
170 40,5																												
160 40,0																												
150 39,5																												
140 39,0																												
130 38,5																												
120 38,0																												
110 37,5																												
100 37,0																												
90 36,5																												
80 36,0																												
70 35,5																												
60 35,0																												



